

MEDISED 20X 20 mg/ml

Reg. SAGARPA: Q-0609-011

DOSIS Y DIRECCIONES DE USO

Para la contención química en las especies indicadas MEDISED 20X (Medetomidina) debe usarse en combinación con otros anestésicos en las siguientes dosis:

Venado cola blanca (<i>O. virginianus</i>) y burra (<i>O. hemionus</i>)		
Medetomidina	+ Ketamina	
0.03-0.1 mg/kg	+ 1.5 - 2.5 mg/kg	
	+ Butorfanol	+ Azaperona
0.1 - 0.2 mg/kg	0.3 - 0.58 mg/kg	0.16 - 0.4 mg/kg
	+ Ketamina	+ Tiletamina/ Zolazepam
0.063 - 0.15 mg/kg	1 - 1.5 mg/kg	1 - 2 mg/kg
León (<i>Panthera leo</i>)		
	+Butorfanol	+Midazolam
0.05 mg/kg	0.3 mg/kg	0.2 mg/kg
	+Ketamina	+Midazolam
0.02 mg/kg	2 mg/kg	0.1 mg/kg
	+ Ketamina	
0.02-0.06 mg/kg	2.5 - 6 mg/kg	
Oso café (<i>Ursus arctos</i>)		
	+tilletamina/zolazepam	
0.02-0.14 mg/kg	1.9 - 6.9 mg/kg	
	+tilletamina/zolazepam	+ketamina
0.02-0.05 mg/kg	0.9-2.8 mg/kg	1.1-3 mg/kg
Oso negro (<i>Ursus americanus</i>)		
Medetomidina	+ketamina	
0.04 mg/kg	1.5 mg/kg	
	+tilletamina/zolazepam	
0.05 mg/kg	0.86 - 2 mg/kg	
	Butorfanol	Azaperona
0.087- 0.1 mg/kg	0.26 - 0.3 mg/kg	0.22 - 0.25 mg/kg
Oso polar (<i>Ursus maritimus</i>)		
	+tilletamina/zolazepam	
0.06 mg/kg	2.2 mg/kg	
Ocelote (<i>Leopardus pardalis</i>)		
	+Ketamina	
0.04-0.05 mg/kg	4.5 - 5 mg/kg	
	+tilletamina/zolazepam	
0.04 mg/kg	3 mg/kg	
Puma (<i>Puma concolor</i>)		
	+Ketamina	
0.07 - 0.08	2.5- 4 mg/kg	